

Lääketaukosuositukset diagnostiseen spirometriatutkimukseen

Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tutkittavan tulisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään suositeltu aika:

Antikolinergit	lyhytvaikutteiset 1 vrk, pitkävaikutteiset 2 - 12 vrk
Fenyylipropanoliamiini	12 h
Kortikosteroidit	4 vk
Leukotrieeniantagonistit	3 vrk
Natriumkromoglikaatti	12 h
Nedokromiili	24 h
Sympatomimeetit	lyhytvaikutteiset 12 h, pitkävaikutteiset 2 - 7 vrk
Teofylliinit	3 vrk
Yskänlääkkeet	3 vrk
Yhdistelmävalmisteet	48 h - 4 vk

Taulukko 1. Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tauotettavat lääkkeet

Lääkeaineryhmä	Kauppanimi	Lääketauko vähintään
Lyhytvaikutteiset antikolinergit	Atro dual, Atrovent, Atrovent comp, Ipramol, Ipraxa, Salipra	24 h
Pitkävaikutteiset antikolinergit	Eklira, Duaklir	2 vrk
	Anoro, Incruse	3 vrk
	Spiriva	4 vrk
	Seebri, Ultibro	12 vrk
Fenyylipropanoliamiini	Rinexin, Rinomar	12 h
Kortikosteroidit #	Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budenofalk, Budesonid(e), Dexametason, Entocort, Flixotide, Flutide, Hydrocortison, Medrol, Novopulmon, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solomet	4 vk
Leukotrieeniantagonistit	Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair	3 vrk
Natriumkromoglikaatti	Lomudal (inhalaatio sumute)	12 h
Nedokromiili	Tilade	24 h
Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	Adrenalin, Epipen, Airomir, Bricanyl, Buventol, Racinephrine, Salbutamol, Ventilastin, Ventoline	12 h
Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	Onbrez, Striverdi	7 vrk
	Cycloterol, Fomeda, Foradil, Formaxa, Formoterol, Oxis, Serevent	2 vrk
Teofylliinit	Aminocon, Euphylong, Nuelin depot, Retafyllin, Theofol (comp), Theofylliini	3 vrk
Yskänlääkkeet	Kaikki	3 vrk
Muut bronkodilatoivat lääkkeet	Daxas	5 vrk
Yhdistelmävalmisteet (steroidi ja pitkävaikutteinen sympatomimeetti)	Bufomix, Flutiform, Innovair, Seretide, Symbicort	48 h tai 4 vk*
	Relvar	72 h tai 4 vk*

#= muiden sairauksien kuin astman ja COPD:n hoitoon tarkoitettuja systeemilääkkeitä ei tarvitse tauottaa. *= aika 4 viikkoa, jos halutaan sulkea pois kortikosteroidivaikutus

Taulukko 2. Tauotettavat lääkkeet aakkosittain

Kauppanimi	Lääkeryhmä	Tauko väh.	Kauppanimi	Lääkeryhmä	Tauko väh.
<i>Accolate</i>	Leukotrieeniantagonistit	3 vrk	<i>Incruse</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	3 vrk
<i>Adrenalin</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h	<i>Innovair</i>	Yhdistelmävalmisteet	48 h / 4 vk ²
<i>Aerobec</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Ipramol</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h
<i>Airomir</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h	<i>Ipraxa</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h
<i>Alvesco</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Lomudal</i>	Natriumkromoglikaatti	12 h
<i>Aminocon</i>	Teofylliinit	3 vrk	<i>Medrol</i> ¹	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Anoro</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	3 vrk	<i>Montelukast</i>	Leukotrieeniantagonistit	3 vrk
<i>Asmanex</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Novopulmon</i>	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Astecon</i>	Leukotrieeniantagonistit	3 vrk	<i>Nuelin depot</i>	Teofylliinit	3 vrk
<i>Atrodual</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h	<i>Onbrez</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	7 vrk
<i>Atrovent</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h	<i>Oxis</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk
<i>Atrovent comp</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h	<i>Prednisolon</i> ¹	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Beclomet</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Prednison</i> ¹	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Bricanyl</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h	<i>Pulmicort</i>	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Budonofalk</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Racinephrine</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h
<i>Budesonid(e)</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Relvar</i>	Yhdistelmävalmisteet	72 h / 4 vk ²
<i>Bufomix</i>	Yhdistelmävalmisteet	48 h / 4 vk ²	<i>Retafyllin</i>	Teofylliinit	3 vrk
<i>Buventol</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h	<i>Rinexin</i>	Fenyylipropanoliamiini	12 h
<i>Cykloterol</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk	<i>Rinomar</i>	Fenyylipropanoliamiini	12 h
<i>Daxas</i>	Muut bronkodilatoivat lääkkeet	5 vrk	<i>Salbutamol</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h
<i>Dexametason</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Salipra</i>	Lyhytvaikutteiset antikolinergit	24 h
<i>Duaklir</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	2 vrk	<i>Seebri</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	12 vrk
<i>Efedrin</i>	Efedriini	12 t	<i>Seretide</i>	Yhdistelmävalmisteet	48 h / 4 vk ²
<i>Efedriini (hydrokl.)</i>	Efedriini	12 t	<i>Serevent</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk
<i>Eklira</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	2 vrk	<i>Singulair</i>	Leukotrieeniantagonistit	3 vrk
<i>Entocort</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Solomet</i> ¹	Kortikosteroidit	4 vk
<i>Epipen</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h	<i>Spiriva</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	4 vrk
<i>Euphyllong</i>	Teofylliinit	3 vrk	<i>Striverdi</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	7 vrk
<i>Flixotide</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Symbicort</i>	Yhdistelmävalmisteet	48 h / 4 vk ²
<i>Flutide</i>	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Theofol (comp)</i>	Teofylliinit	3 vrk
<i>Flutiform</i>	Yhdistelmävalmisteet	48 h / 4 vk ²	<i>Theofylliini</i>	Teofylliinit	3 vrk
<i>Fomeda</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk	<i>Tilade</i>	Nedokromiili	24 h
<i>Foradil</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk	<i>Ultibro</i>	Pitkävaikutteiset antikolinergit	12 vrk
<i>Formaxa</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk	<i>Ventilastin</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h
<i>Formoterol</i>	Pitkävaikutteiset sympatomimeetit	2 vrk	<i>Ventoline</i>	Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit	12 h
<i>Hydrocortison</i> ¹	Kortikosteroidit	4 vk	<i>Yskänlääkkeet</i>	Kaikki yskänlääkkeet	3 vrk

¹ Tauko vain jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon.² Aika 4 viikkoa, jos halutaan sulkea pois kortikosteroidivaikutus.